

动协调性有影响,睡眠实验表明可显著协同延长巴比妥的睡眠时间。此外,该提取物可延缓震颤素诱导的震颤发作时间并减弱其程度,有中等程度的抗震颤作用。完全阻断离体蛙坐骨神经传导而表现明显局部麻醉作用。

【药性】 苦,温。归肺、脾、肾经。

1.《新修本草》:“味苦,温,无毒。”

2.《海药本草》:“温,平。”

3.《本草求真》:“入肾,兼入脾、胃。”

4.《会约医镜》:“入肺、肾二经。”

【功用主治】 湿肠,固精,敛肺,止血。主治久泻久痢,遗精,盗汗,咳嗽,咯血,便血,创伤出血,疮疡久不收口。

1.《药性论》:“治大人、小儿大腹冷,滑利不禁。”

2.《新修本草》:“主赤白痢,肠滑,生肌肉。”

3.《海药本草》:“主肠虚冷痢,益血生精,乌须发,和气安神。治阴毒、瘰,烧灰用。”

4.《开宝本草》:“主小儿疳瘕,能黑须发,治阴疮,阴汗,温中和气。”

5.《本草从新》:“湿精固气,强阳助阳,止遗淋。”

6.《现代实用中药》:“治遗精、滑精、盗汗,以及慢性气管炎,痰多咳嗽,咯血咳血等症;外用于刀伤出血,慢性皮肤病等症。”

【用法用量】 内服:煎汤,5~10 g,或入丸、散。外用:研末撒或调敷。

【宜忌】 泻痢初起或内有湿热或积滞者禁服。

1.《雷公炮炙论》:“凡用勿令犯铜、铁。”

2.《本草经疏》:“赤白痢由于湿热郁于肠胃兼积滞者多不宜用。”

3.《本草从新》:“性偏止涩,不宜多用、独用。”

4.《中国药理学大辞典》:“凡有实邪者禁用。”

【选方】 1.治小儿洞泄下痢,羸困 没石子(微煨)、河黎勒(煨)用皮各半两。为细散,每服以粥饮调下半钱,日三四服。量儿大小加減。《普济方》没石子散)

2.治血痢,不问远近 没石子一两。细研,以软饭和丸,如小豆大。每服于食前以粥饮下十丸。《普济方》

3.治产后痢 没石子一个。烧,为末。和酒服方寸匕,冷即酒服,热即饮下。《子母秘录》

4.治直肠溃疡,或内痔出血 没食子 15 g,地榆 15 g,槐花 10 g,水 500 ml,煎至 200 ml,去渣滤过,待温,用玻璃水节(灌肠器)灌肛内,每次 60~100 ml。《现代实用中药》

5.治小儿一切口疮,止疼痛 没石子三分(微火炙),甘草一分。上药捣细罗为散。每于疮上薄涂,盖令遍。《圣惠方》

6.治牙齿疼痛 没石子不拘多少,捣罗为散。以绵裹一钱,当痛处咬之即定,有涎吐之。《圣济总录》没石子散)

7.治鼻面酒皰 南方没石子有孔者,水磨成膏,夜夜涂之。《世医得效方》

8.治肉刺 无食子三枚,肥皂荚一挺,上烧令烟尽,细研,以酃醪于砂盆内别磨皂荚如糊。和末敷之,立效。《奇效良方》无食膏)

【各家论述】 《本草求真》:“没食子,功专入肾固气,凡梦遗精滑,阴痿肉痛,腹冷泄泻,疮口不收,阴汗不止,一切虚火上浮,肾气不固者,取其苦以坚肾,温以暖胃健脾,黑以入肾益气补精。俾气按纳丹田,不为走泄,则诸病自能克愈矣。至书所云安神定魄,亦是神气既收,不为外浮之害。他如烧黑灰煎汤以治阴毒,合他药以须发,为末以擦牙骨,皆是赖其收涩之力,以为保护,无他道也。”

2433 沉香 chén xiāng (别录)

【异名】 蜜香、棧香《南方草木状》;沉香《桂海虞衡志》;奇南香《本草乘雅半偈》;瑯瑁《宦游笔记》;伽楠香《纲

目拾遗》。

【基原】 为瑞香科沉香属植物沉香、白木香含树脂木材。

【原植物】 1. 沉香 *Aquilaria agallocha* Roxb. 又名: 沉水香树、落水沉香树、伽罗树《中药材品种论述》,奇南香木(台湾)。

常绿乔木,高达 30 m。幼枝被绢状毛。叶互生,稍带革质;具短柄,长约 3 mm;叶片椭圆形披针形,披针形或倒披针形,长 5.5~9 cm,先端渐尖,全缘,下面叶脉有时被绢状毛。伞形花序,无梗,或有短的总花梗,被绢状毛;花白色,花被钟形,5 裂,裂片卵形,喉部密被白色绒毛的鳞片 10 枚;雄蕊 10,着生于花被管上,其中有 5 枚较长;子房上位,长卵形,密被柔毛,2 室,花柱极短,柱头扁球形。蒴果倒卵形,木质,扁压状,密被灰白色绒毛,基部有略为木质的宿存花被。种子通常 1 颗,卵圆形,基部具有角状附属物。花期 3~4 月,果期 5~6 月。



沉香

野生或栽培于热带地区。国外分布于印度尼西亚、马来西亚、越南、柬埔寨和印度等国。我国热带地区有引种。

2. 白木香 *A. sinensis* (Lour.) Gilg [Ophipermum sinense Lour.; *A. grandiflora* Benth.] 又名: 土沉香《桂海虞衡志》,女儿香《纲目拾遗》,六麻树、牙香树、莞香。

常绿乔木,高达 15 m。树皮灰褐色,小枝叶柄及花序均被柔毛或夹白色绒毛。叶互生;叶柄长约 5 mm;叶片革质,长卵形、倒卵形或椭圆形,长 5~14 cm,宽 2~6 cm,先端渐尖,基部楔形,全缘。伞形花序顶生和腋生;花黄白色,被绒毛;花被钟形,5 裂,矩圆形,先端钝圆,花被管喉部有鳞片 10 枚,密被白色绒毛,长约 5 mm,基部连合成一环;雄蕊 10 枚,花丝粗壮;子房卵形,密被绒毛。蒴果倒卵形,木质,扁压状,密被灰白色毛,基部具稍带木质的宿存花被。种子黑棕色,卵形,长约 1 cm,先端渐尖,种子基部延长为角状附属物,红棕色。花期 4~5 月,果期 7~8 月。



白木香

生于平地、丘陵土岭的疏林酸性黄壤土或荒山中,并有栽培。分布于广东、广西、海南、台湾等地。

【栽培】 生物学特性 喜温暖湿润气候,耐短期霜冻,耐旱。幼龄树耐阴,成龄树喜光,对土壤的适应性较广,可在红壤或山地黄壤上生长,在富含腐殖质、土层深厚的壤土上生长较快,但结香不多,在瘠薄的土壤上生长缓慢,长势差,但利于结香。

繁殖方法 种子繁殖,育苗移栽。在秋季果熟期,采摘果皮开裂的种子,播于苗床土,按行株距 15 cm×10 cm 下种。幼苗经培育 1 年,苗高 50~80 cm,按行株距 2 m×1.5 m 挖穴移栽定植。

田间管理 幼龄树每年除草松土 4~5 次,并于 2~3 月和 10~11 月各追肥 1 次,以追施人畜粪水和复合肥为主。成龄树施肥量适当增加。



首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

中药大辞典



◎ 南京中医药大学 编著



荣誉一类并韩国中国首
类并图类称贡献出国中国二第

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

责任编辑 虞厚安 刘诗发
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)
南京中医药大学 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8
字数 10917 千
1986年5月第1版
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505
定价:198.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换



Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版
上册

