

用：适量，捣敷；或煎汤熏洗；或浸酒涂。

【禁忌】 肝阳上亢者慎服。

【选方】 1. 治胃、十二指肠溃疡，慢性胃炎 龙牙楸木根皮 5 kg。加水 25 kg，熬成膏。每服 3～5 ml，每日 3 次。（《全国中草药汇编》）

2. 治风湿性腰腿痛 龙牙楸木根皮 15 g。水 1 碗，黄酒半碗，煎为 1 碗，早晚各服 1 剂。（《长白山植物药志》）

3. 治跌打损伤 鲜楸木根 18 g，土鳖虫 9 g。酒煎内服，亦可外洗。（《青岛中草药手册》）

4. 治肝硬化腹水 刺老牙根皮、猪瘦肉各 125 g。加水炖熟后喝汤食肉。（《辽宁常用中草药手册》）

5. 治脱肛 楸木根、五倍子各 15～30 g。煎水熏洗。（《青岛中草药手册》）

2721 刺竹叶 cí zhú yè  
（《全国中草药汇编》）

【基原】 为禾本科箬竹属植物车筒竹的叶。

【原植物】 参见“刺竹笋”条。

【采收加工】 全年均可采，随采随用。

【功用主治】 凉血，清热。主治小儿高热，感冒风热，尿路感染、鼻衄。

【用法用量】 内服：煎汤，6～15 g。

2722 刺竹茹 cí zhú rú  
（《全国中草药汇编》）

【基原】 为禾本科箬竹属植物车筒竹的茎秆除去外皮后刮下的中间层。

【原植物】 参见“刺竹笋”条。

【采收加工】 全年均可采，砍取茎秆，刮去外层皮，然后将中间层刮成丝状，晒干。

【功用主治】 清热。主治胃热呕吐、呃逆。

【用法用量】 内服：煎汤，3～9 g。


2723 刺竹笋 cí zhú sǔn  
（《纲目》）

【异名】 箬竹笋（赞宁《笋谱》），笏竹笋（《岭南采药录》），竹笋（《全国中草药汇编》）。

【基原】 为禾本科箬竹属植物车筒竹的嫩茎、芽。

【原植物】 车筒竹 *Bambusa sinosinosa* Mc Clure 又名：笏竹、簕竹、答黎竹、楠竹、莒竹（《竹谱详录》），芭竹（《纲目》），大竹、水筒竹、大筒竹、簕竹、刺竹（《岭南科学杂志》11 卷），楠筒竹（《中国竹类植物志略》）。

高大竹类。竿高 15～24 m，直径 8～15 cm，尾梢略弯；节间长 20～26 cm，常光滑无毛，惟其基部 1～2 节常于节下环生 1 圈灰白色绢毛；节处稍突起，解箨后在其箨环上暂时留有 1 圈稠密的暗棕色刺毛；分枝常自竿基部第一、第二节上即开始，竿下部的为单枝，向下弯拱，其上的小枝多短缩为硬刺，且相互交织而成密刺丛，竿中上部分枝为 3 至数枚丛生。箨鞘迟落，革质，近边缘处密生暗棕色刺毛，先端近截形；箨耳近相等，长圆形至倒卵形，有波状皱褶；箨舌边缘齿裂并被流苏状毛；箨片直立或外展，卵形。叶鞘近无毛，边缘一侧被短纤毛；耳叶不甚发达；叶舌先端斜截形，全缘；叶片线状披针形，长 7～17 cm，宽 12～16 mm，先端渐尖，基部



车筒竹

近圆形。假小穗线状披针形，长达 4 cm，单生或数枚簇生于花枝各节；小穗含两性小花 6～12 朵；小穗轴节间长 2～4 mm；颖常缺；外稃卵状长圆形，内稃通常稍长于外稃，具 2 脊；鳞被 3，不相等，倒卵形，边缘密生纤毛；花丝分离，花药先端钝；子房狭窄，先端增厚而被短硬毛，花柱细长，被短硬毛，柱头 3 分，羽毛状。笋期 5～6 月，花期 8～12 月。

生于河流两岸或村落附近。分布于华南、西南诸地。亦有栽培。

本植物的叶（刺竹叶）、茎秆除去外皮后刮下的中间层（刺竹茹）亦供药用，另设专条。

【采收加工】 5～6 月采收，鲜用或晒干。

【药性】 甘、苦，凉。

1. 赞宁《竹谱》：“甘、苦，有小毒。”（引自《纲目》）

2. 《岭南采药录》：“味苦。”

3. 《全国中草药汇编》：“甘、酸，平。”

【功用主治】 消积，止痢。主治消化不良，痢疾。

1. 《岭南采药录》：“治竹木刺入肉。”

2. 《全国中草药汇编》：“凉血止痢，清热生津。主治消化不良，痢疾。”

【用法用量】 内服：煎汤，30～60 g。外用：捣敷。

【禁忌】 赞宁《竹谱》：“食之落人发。”（引自《纲目》）

【选方】 1. 治消化不良，痢疾 竹笋 30～60 g，水煎服；或用竹笋水 30～60 g，内服。（《全国中草药汇编》）

2. 治竹木刺入肉 笏竹笋、酒糟、车前子、盐。四味同捣敷患处。（《岭南采药录》）

2724 刺血红 cì xuè hóng  
（广州空军《常用中草药手册》）

【异名】 七星剑、血路草（广州空军《常用中草药手册》）。

【基原】 为爵床科假杜鹃属植物花叶假杜鹃的全株。

【原植物】 花叶假杜鹃 *Barleria lupulina* Lindl.

灌木，高约 2 m。茎

直立，多分枝。叶对生；有短柄；叶片披针形，长 4～8 cm，先端渐尖，基部楔形，两面均被白色柔毛；在叶柄基部有一对向下的针刺，紫红色。穗状花序顶生或腋生；具多数大苞片；萼片 4，成对，外面一对较大；花黄色，花冠管状，5 裂，裂片近相等；发育雄蕊 2～3，退化雄蕊 1～2；子房上位，2 室，花柱长。蒴果卵形，中部以下有种子 4 颗。花期 5～7 月。

生于山谷湿地、村旁或路边，也有栽培。分布于广东。

【采收加工】 全年可采，切段，鲜用或晒干。

【成分】 地上部分含环烯醚萜苷类化合物；山梗苷甲酯（shanzhiside methyl ester），假杜鹃素（barlerin），乙酰假杜鹃素（acetylbarlerin），6-O-乙酰基山梗苷甲酯（6-O-acetylshanzhiside methyl ester），7-乙酰基野芝麻新苷（ipolamiidoside）。另含甜菜碱（etaine）。

【药性】 辛、苦，平。

1. 《全国中草药汇编》：“辛、苦，温。”

2. 《西双版纳傣药志》：“凉。”

【功用主治】 活血，续筋，解毒。主治跌打肿痛，骨折，外伤出血，痢痛，毒蛇咬伤。



花叶假杜鹃

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

# 中药大辞典

◎ 南京中医药大学 编著





第一类 医药、卫生、保健  
第二类 医药、卫生、保健

---

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).  
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)  
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典  
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

---

责任编辑 虞厚安 刘诗发  
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)  
南京中医药大学 编著

---

上海世纪出版股份有限公司 出版  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行  
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co  
苏州望电印刷有限公司印刷  
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8  
字数 10917 千  
1986年5月第1版  
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷  
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505  
定价:198.00 元

---

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,  
请向工厂联系调换



Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

# 中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版  
上册

