

0638 丰城鸡血藤 fēng chéng jī xuè téng
(江西草药)

【异名】老人筋(《广西药用植物名录》),鸡血藤(《江西草药》)。

【基原】为豆科鸡血藤属植物丰城鸡血藤的根及藤茎。

【原植物】丰城鸡血藤 *Millettia nitida* Benth. var. *hirsutissima* Z. Wei

落叶攀缘灌木,茎长达5 m。根粗壮,皮层红色。枝被有锈色绒毛。叶互生,奇数羽状复叶长10~15 cm;叶柄长3~6 cm;叶片卵形,较小,长5~9 cm,宽2.5~3 cm,先端尖或钝,基部宽楔形,下面叶脉突出,具短毛,全缘,上面暗淡,下面密被红褐色硬毛;小托叶刺毛状,不脱落。总状花序顶生和腋生,并于枝端组成圆锥花序;花萼钟形,先端5齿裂;花冠蝶形,紫红色;雄蕊10,二体;子房线形,外被丝状毛。荚果条状长圆形,扁平,长5~8 cm,密被淡绿色绒毛,种子3~6颗,扁长圆形。花期5~9月,果期7~11月。

生于丘陵、山地、林边、灌木丛中。分布于福建、江西、湖南、广东、广西等地。

【采收加工】7~10月采收,鲜用或晒干。

【药理】1. 对血液系统的作用 丰城鸡血藤乙醇提取物能抑制由胶原诱导的兔血小板聚集作用,抑制率为27.3%~74.2%;对兔红细胞凝聚作用的影响与浓度有关,即高浓度时抑制红细胞凝聚,低浓度则促进其凝聚。

2. 抗炎作用 丰城鸡血藤酊剂2 g/kg给大鼠灌胃,对甲醛性关节炎有明显抑制作用。

3. 其他作用 丰城鸡血藤煎剂或酊剂静注0.01~0.4 g/kg,对麻醉犬的呼吸、血压及蛙下肢血管灌流无明显影响。大鼠腹腔注射酊剂有镇静催眠作用。

【药性】《江西草药》,“性温,味苦、微甘。”

【功用主治】《江西草药》,“补血行血,舒筋活络。主治体弱畏寒,关节炎,小儿麻痹症(瘫痪期),扭伤腰痛。”

【用法用量】内服:煎汤,9~30 g;或浸酒。外用:捣敷。

【选方】1. 治体弱畏寒 丰城鸡血藤根60 g,水煎去渣,打入鸡蛋2个,同煮。服汤食蛋,每日1剂,连服7日。

2. 治血虚月经不调 鸡血藤膏9 g,冰糖15 g。调服。

3. 治遗精 鸡血藤、巴戟、石斛各9 g,益智3 g。每日1剂,煎服。

4. 治小儿麻痹症(瘫痪期) 丰城鸡血藤根、钩藤根、爬山虎、五加根皮、淫羊藿根各6 g。砂糖、米酒为引,水煎服,每日1剂。(1~4方出自《江西草药》)

0639 王瓜 wáng guā
(《本草经》)

【异名】钩萆蛄(《尔雅》),土瓜(《本草》),钩萆(《尔雅》郭璞注),雹瓜(《圣惠方》),老鸦瓜(《本草图经》),野甜瓜、马苞儿(《丹溪纂要》),马刺儿(《医学入门》),马瓠瓜、公公须(《纲目》),杜瓜、鸽蛋瓜(《福建民间草药》),吊瓜(《浙江中药手册》),山冬瓜、水瓜(《闽东本草》),苦瓜莲、小苦兜(《江西民间草药验方》)。

【基原】为葫芦科栝楼属植物王瓜的果实。

【原植物】王瓜 *Bryonia cucumeroides* (Ser.) Maxim.
[*Bryonia cucumeroides* Ser.]

多年生草质藤本,全株被短柔毛。块根纺锤形,肥大。茎细弱,多分枝,具纵棱和槽。卷须2歧。叶互生;叶柄长3~10 cm,具

纵条纹;叶片纸质,阔卵形或圆形,先端钝或渐尖,基部深心脏形,边缘具细齿或波状齿,长5~13(~19) cm,宽5~12(~18) cm,常3~5浅裂至深裂,或有时不分裂,裂片卵形或倒卵形,上面深绿色,下面淡绿色,基出掌状脉5~7条。花雌雄异株;雄花成总状花序,或1单花与其并生,总花梗长5~10 cm,具纵条纹,小苞片线状披针形,花萼筒喇叭形,裂片线状披针形,花冠白色,裂片长圆状卵形,具极长的丝状流苏,雄蕊3,花丝短,分离,退化雌蕊刚毛状;雌花单生,子房长圆形,花萼花冠与雄花同。果实卵圆形、卵状椭圆形或球形,长6~7 cm,径4~5.5 cm,成熟时橙红色,平滑,两端钝圆,具喙;果柄长5~20 mm。种子横长圆形,长7~12 mm,宽7~14 mm,深褐色,两侧宽大,近圆形,径约4.5 mm,表面具瘤状突起。花期5~8月,果期8~11月。

生于海拔(250~)600~1700 m的山谷森林中或山坡疏林中或灌木丛中。分布于华东、华中、华南和西南等地。

本植物的种子(王瓜子)、根(王瓜根)亦供药用,另设专条。

【采收加工】10月果熟后采收,鲜用或连柄摘下,防止破裂,用线将果柄串起,挂于日光下或通风处干燥。

【药材】王瓜 *Trichosanthis Cucumeroides* Fructus 产于江苏、福建、浙江、江西、湖北、四川等地。

性状 果实卵状椭圆形或椭圆形,先端窄,基部钝圆。青时有10~12条苍白色条纹,熟后橙红色。果皮薄,光滑,稍有光泽。果梗长5~20 mm。种子略呈十字形,似螳螂头,长约12 mm,宽14 mm,中央呈一宽约5 mm的环带,两侧有扁圆形的较小空室,黄棕色,表面有凹凸不平的细皱纹。具香甜气,味甘微酸。

【成分】果实含 β -胡萝卜素(β -carotene),番茄烃(lycopene),7-豆甾烯- β -醇(stigmast-7-en- β -ol),7,22-豆甾二烯- β -醇(stigmasta-7,22-dien- β -ol)即 α -菠菜甾醇(α -spinasterol)。

瓜子含脂肪酸:壬酸(pelargonic acid),癸酸(capric acid),月桂酸(lauric acid),肉豆蔻酸(myristic acid),十五酸(pentadecanoic acid),棕榈酸(palmitic acid),硬脂酸(stearic acid),棕榈油酸(palmitoleic acid),亚油酸(linoleic acid),亚麻酸(linolenic acid)等。

【药性】苦,寒。归心、肾经。


1. 《日用本草》:“味苦、平、凉、无毒。”
2. 《医学入门》:“味酸。”
3. 《医林纂要》:“苦、寒。”
4. 《本草再新》:“入心、肾二经。”
5. 《本草摘要》:“入手、足太阴经。”
6. 《湖南药物志》:“有毒。”

【功用主治】清热,生津,化痰,通乳。主治消渴,黄疸,噎膈反胃,经闭,乳汁不通,痈肿,慢性咽喉炎。

1. 《珍珠囊补遗药性赋》:“导乳汁之泉。”

2. 《日用本草》:“止热燥大渴,消肿毒,除黄疽,行乳汁,通经水。”

3. 《医学入门》:“治噎膈。”



王瓜

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

中药大辞典

◎ 南京中医药大学 编著





第一类 医药、卫生、保健
第二类 医药、卫生、保健

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

责任编辑 虞厚安 刘诗发
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)
南京中医药大学 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8
字数 10917 千
1986年5月第1版
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505
定价:198.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换



Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版
上册

