

【选方】1. 治久病虚弱，肺结核 阔叶猕猴桃 30 g，玉竹、土党各 15 g。水煎服。

2. 治疮疖癌瘤 阔叶猕猴桃鲜果配臭牡丹叶、马齿苋捣烂敷。(1、2 方出自《湖南药物志》)

### 1933 多裂委陵菜 duō liè wéi líng cài (《全国中草药汇编》)

【异名】白马肉(《甘肃中草药手册》)。

【基原】为蔷薇科委陵菜属植物多裂委陵菜的带根全草。

【原植物】多裂委陵菜 *Potentilla multifida* L. 又名：细叶委陵菜(《东北植物检索表》)。

多年生草本，高 12~40 cm。根圆柱形，稍木质化。叶柄及花茎被紧贴或开展短柔毛或绢状柔毛。基生叶为羽状复叶，小叶 3~5 对，稀达 6 对；托叶膜质，褐色，外被疏柔毛，小叶片对生，稀互生，羽状深裂近达中脉，长椭圆形或宽卵形，长 1~5 cm，宽 0.8~2 cm，向基部逐渐缩小，裂片带形或带状披针形，先端舌状或急尖，边缘向下反卷，上面伏生短柔毛，下面被白色绒毛，沿脉密被绢状长柔毛；茎生叶 2~3，形状与基生小叶相似，惟对数向上逐渐减少。花两性；伞房状聚伞花序，花梗被短柔毛；萼片 5，三角卵形，先端急尖或渐尖；副萼片 5，披针形或椭圆披针形，外面被伏生长柔毛；花瓣 5，倒卵形，先端微凹，黄色；花柱近顶生。瘦果。花期 5~8 月。

生于海拔 1200~4300 m 的山坡草地、沟谷及林缘。分布于东北及河北、内蒙古、陕西、西藏等地。

【采收加工】8~11 月采收，切段，晒干。

【药性】《甘肃中草药手册》：“甘、微苦，寒。”

【功用主治】《甘肃中草药手册》：“止血，杀虫，利湿热。主治外伤出血，崩漏，肝炎及蛲虫病。”

【用法用量】内服：煎汤，15~30 g。外用：适量。研末敷。

【选方】1. 治崩漏(功能性子宫出血) 白马肉 30 g，水煎服；或研末冲服，每次 15 g。

2. 治肝炎 白马肉 15 g，柴胡 12 g，竹叶 6 g。水煎。代茶饮。(1、2 方出自《甘肃中草药手册》)

### 1934 多穗石柯叶 duō suì shí kē yè (《全国中草药汇编》)

【异名】甜茶叶(《四川常用中草药》)。

【基原】为壳斗科石栎属植物多穗石栎的叶。

【原植物】参见“多穗石柯根”条。

【采收加工】5~10 月摘叶，晒干或鲜用。

【药材】多穗石柯叶 *Lithocarpus Polystachyi Folium* 产于云南、四川、贵州、湖北、广东、广西、江西、福建、浙江等地。

性状 叶革质，多皱缩卷曲，破碎，展平后呈倒卵状椭圆形，背面叶脉突出，先端渐尖或尾尖，基部楔形，全缘。质脆。气微，味甜。

鉴别 叶横切面：上表皮细胞 1 列，外被角质层。下表皮细胞 1 列，排列较整齐，有非腺毛。栅栏组织内 1 列细胞，内含黄棕色；海绵组织 4~6 列细胞，排列疏松；主脉维管束明显，中柱鞘纤维呈环状排列。薄壁细胞含草酸钙簇晶。

【成分】叶含 3 萜类成分：无羁萜醇(friedelin)，无羁萜- $\beta$ -醇(friedelan- $\beta$ -ol)， $\beta$ -黏萜烯醇(glutinol)， $\beta$ -香树脂醇( $\beta$ -amyrin)，蒲公英萜醇(taraxerol)，石柯酮(lithocarpolone)，石柯二醇(lith-



多裂委陵菜

ocarpdiol)，24-亚甲基环木菠萝烷- $\beta$ ，21-二醇(24-methylenecycloartan- $\beta$ ，21-diol)。酚酸类：根皮苷(phlorizin)，对根皮苷( $p$ -trilobatin)，3-羟根皮苷(3-hydroxyphlorizin)。黄酮类：垂石松黄酮苷(cernuoside)，阿福豆苷(alfezin)，异槲皮苷(isoquercitrin)，2'-对香豆酰基紫云英苷(2'- $p$ -coumaroylstragalol)。

【药性】《四川常用中草药》：“性平，味甘、苦。”

【功用主治】清热解暑，降压。主治湿热泻痢，肺热咳嗽，痢痕疮疡，皮肤痒疹，高血压病。

1. 《四川常用中草药》：“清热，止泻。治痢疽恶毒疮，皮肤痒疹，湿热带疾。”

2. 《浙江药用植物志》：“治高血压病。”

【用法用量】内服：煎汤，10~15 g。外用：捣敷；或煎水洗。

【选方】治湿热泻痢 甜茶叶 15 g，千里光 12 g，三颗针 12 g。水煎服。(《四川中药志》1979 年版)

### 1935 多穗石柯茎 duō suì shí kē gēng (《广西药用植物名录》)

【基原】为壳斗科石栎属植物多穗石栎的茎枝。

【原植物】参见“多穗石柯根”条。

【采收加工】全年均可采，晒干。

【功用主治】祛风湿，活血止痛。主治风湿痹痛，损伤骨折。

【用法用量】内服：煎汤，10~15 g。

### 1936 多穗石柯果 duō suì shí kē guǒ (《四川常用中草药》)

【异名】甜茶果(《四川常用中草药》)。

【基原】为壳斗科石栎属植物多穗石栎的果实。

【原植物】参见“多穗石柯根”条。

【采收加工】9~10 月果实成熟时采收，鲜用或晒干。

【药性】《四川常用中草药》：“性平，甘、涩。”

【功用主治】《四川中药志》1979 年版：“和胃降逆。用于噎膈呃逆。”

【用法用量】内服：煎汤，15~30 g。

【选方】治呃逆 甜茶果 25 g，香附 10 g。水煎服。(《四川中药志》1979 年版)

### 1937 多穗石柯根 duō suì shí kē gēn (《全国中草药汇编》)

【异名】甜茶根(《四川常用中草药》)。

【基原】为壳斗科石栎属植物多穗石栎的根。

【原植物】多穗石栎 *Lithocarpus polystachyus* (Wall.) Rehd. [*Quercus polystachyus* Wall.; *Q. litseiifolius* Hance]

又名：楼叶柯(《海南植物志》)，多穗柯、黑石栎(《广西药用植物名录》)，天叶柯、鸡山柯(《中国树木志》)。

常绿乔木，高 11~15 m。小枝幼时淡褐色，老时干后暗褐黑色。叶互生；叶柄长 2~2.5 cm，基部增粗，常呈暗褐色，有时被灰白色粉霜；叶片革质，长椭圆形或卵状长椭圆形，长 7~14 cm，宽 3~4 cm，先端急尖或突然渐尖，基部楔形，全缘，下面稍带灰白色，侧脉 7~10 对，支脉纤细。

雄花序极少复穗状；雌花 3

朵一簇，常 1 朵结实。果序

轴纤细；壳斗浅盘形，包围

坚果基部；鳞状苞片轮状排

列，细小，除顶部外与壳斗

愈合，被褐色绒毛；坚果

扁球形，未成熟时顶部微尖

状，成熟时近平坦，中央有

短尖头，基部截平；果脐深

内陷。花期 5~9 月，果期翌

年 5~9 月。



多穗石栎

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

# 中药大辞典

◎ 南京中医药大学 编著





第一类 医药、卫生、保健  
第二类 医药、卫生、保健

---

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).  
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)  
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典  
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

---

责任编辑 虞厚安 刘诗发  
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)  
南京中医药大学 编著

---

上海世纪出版股份有限公司 出版  
上海科学技术出版社  
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行  
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co  
苏州望电印刷有限公司印刷  
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8  
字数 10917 千  
1986年5月第1版  
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷  
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505  
定价:198.00 元

---

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,  
请向工厂联系调换





Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖  
第二届中国出版政府奖图书奖

# 中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版  
上册

