

基异植醇(4(R)-4-hydroxyisophytol), (10R)-羟基-7Z, 11E, 13Z-十六碳三烯酸[(10R)-hydroxyhexadeca-7Z, 11E, 13Z-trienoic acid], 11Z-十六碳烯酸(11Z-hexadecenoic acid)及7Z, 10Z, 13Z-十六碳三烯酸(7Z, 10Z, 13Z-hexadecatrienoic acid)。

【药理】1. 对心血管的作用 1%浮萍煎剂对健康的高体和低体蛙无明显影响,但对奎宁引起衰竭的蛙心有显著强心作用,钙剂能增强此强心作用;如剂量过大,可使心跳停止在舒张期。强心作用机制可能是直接作用。此外,浮萍尚有收缩血管和升高血压作用。

2. 抗感染作用 浮萍在体外对肠道埃可病毒(ECHO₁₁)有抑制作用;在感染同时或感染后给药均可延缓人胚肾单层细胞病变的出现时间。

3. 利尿作用 紫萍和青萍均有利尿作用。紫萍的利尿作用可持续3~4小时,青萍属于利尿较快的中药,前2小时已占总排出的50%以上。紫萍和青萍均有明显的排Na⁺和排K⁺作用,浮萍对尿pH没有影响,均为正常酸性尿。

4. 促进黑素细胞生长 浮萍醇提取物浓度在0~250 μg/ml时对黑素细胞促生长作用明显,且呈剂量依赖关系。

5. 其他作用 浮萍能使牛凝血酶原和入血纤维蛋白原的凝集时间延长,有一定抗凝作用。紫萍叶子在现场和实验室条件下均能吸收氯,蓄积氯化物,可用于降低天然水中氯的水平,用于防治高氯所致的氟中毒。青萍对库蚊幼虫和蚊幼有杀灭作用,能抑制蚊类幼虫生长,降低蚊类幼虫密度。

【药性】辛,寒。归肺、膀胱经。

1. 《本经》:“味辛,寒。”

2. 《别录》:“酸,无毒。”

3. 《滇南本草》:“味苦,性寒。”

4. 《品汇精要》:“气薄味厚,阴中之阳。”

5. 《雷公炮制药性解》:“入肺、小肠二经。”

6. 《医林纂要》:“平,有咸味。”

7. 《本草求真》:“入肝、脾。”

8. 《本草用法研究》:“入肺、膀胱二经。”

【功用主治】发汗解表,利水消肿,清热解暑。主治风热表证,麻疹不透,隐疹痒痛,水肿,瘰疬,疮痍,丹毒,烫伤。

1. 《本经》:“主暴热身痒,下水气,胜酒,长须发,止消渴。久服轻身。”

2. 《别录》:“下气,以沐浴生毛发。”

3. 《新修本草》:“主火疮。”

4. 《本草拾遗》:“未敷面煎。捣汁服之,主水肿,利小便。”

5. 《日华子》:“治热毒,风热疾,热狂,痲疹,汤火疮,风疹。”

6. 《滇南本草》:“发汗,解毒。治疥癩、疮痍,祛皮肤痒痛之风。”“疗妇人诸经客热,清胎热,妇人湿热带下,用之(效)。”

7. 《纲目》:“主风湿痒痹,脚气,打扑损伤,目赤翳膜,口舌生疮,吐血,衄血,痲风,丹毒。”

8. 《玉楸药解》:“辛凉发表。治痘疫斑疹,疗肌肉麻痺、中风歪斜、痲痹、医痢症热毒、隐疹痒痛、杨梅粉刺、汗斑皆良,利小便闭癰,消肌肤肿胀。”

【用法用量】 内服:煎汤,3~9g,鲜品15~30g;或捣汁;或入丸、散。外用:煎水熏洗;研末撒或调敷。

【宜忌】 表虚自汗者禁服。

1. 《本草经疏》:“表气虚而自汗者勿用。”

2. 《本草从新》:“非大实大热,不可轻试。”

3. 《得配本草》:“血虚肤痒,气虚风痛,二者禁用。”

【选方】 1. 治时行热病 浮萍草一两,麻黄(去节、根)、桂心、附子(炮裂,去皮、皮)各半两。四物捣细筛。每服二钱,以水一中盏,入生姜半分,煎至六分,不计时候,和滓热服。《本草图经》中盘,人生决凉伤寒 紫背浮萍一钱,犀角屑半钱,钩藤钩三七个。

为末,每服半钱,蜜水下,连进三服,出汗为度。《圣济总录》

3. 治一切风疾及癰疹,紫白痲风,痛痒顽麻 采紫背浮萍草摊于竹筛内,下着水,晒干为细末,炼蜜丸如弹子大,每服一丸,用黑豆淋酒化下。《直指方》

4. 治风热癰疹 浮萍(蒸过焙干),牛蒡子(酒煮晒干,炒)各一两。为末,每薄荷汤服一钱,日二次。《养生必用方》

5. 治身上虚痒 浮萍末一钱,以黄芩一钱同四物汤煎汤调下。《丹溪纂要》

6. 治急性肾炎 浮萍60g,黑豆30g。水煎服。《全国中草药汇编》

7. 治吐血不止 紫背浮萍(焙)半两,黄芪(炙)二钱半。为末,每服一钱,姜、蜜水下。《圣济总录》

8. 治消渴饮水日至一石者 浮萍捣汁服之。又方用于浮萍、栝楼根等分,为末,入乳汁和九梧子大。空腹服三十丸。三年者,数日愈。《千金方》

9. 治胬肉攀睛 青萍少许,研烂,入片脑少许,贴眼上。《世医医效方》

10. 治疮疹入眼,痛楚不忍,恐伤其目 浮萍草阴干为末,每服一二钱,用羊子肝半片,入盆子内,以竹杖子刺碎烂,投水半合,绞取肝汁,调药服之,食后。不甚者一服便瘳,若目已伤者,十服瘳。

11. 治小儿泻痢多时,青黄羸瘦,脱肛不收 浮萍草不拘多少,晒干,杵为细末,干贴。《10, 11方出自《小儿卫生总微论方》

【临床报道】 治疗痤疮 浮萍10g,珍珠层粉1g,研细过100目筛,封装备用。治疗痤疮220例,使用时温水清洁面部,常规消毒炎症性皮疹,黑头粉刺,用痤疮针或小镊子清除脓疱,角栓,涂擦红霉素软膏于伤口,离子喷雾5分钟,浮萍散适量加2/3蒸馏水,1/3蜂蜜调成稀糊状,均匀涂于面部(眼口除外)约4分钟,30~40分钟后洗净,外涂维生素B₆软膏,5~7日1次,4次为1个疗程。结果:痊愈152例,有效68例;最短2次,最长3个疗程,总有效率100%。

【各家论述】 1. 《纲目》:“浮萍,其性轻浮,入肺经,达皮肤,所以能发汗邪汗也。”

2. 《本草汇言》:“此药专得寒水清阴之气以生,夏天清阳之气以长。体性轻燥,善去皮肤湿热风疹。”

3. 《本草经疏》:“水萍,其体轻浮,其性清燥,能祛湿热之药也。热气郁于皮肤则作痒,味辛而气清寒,故能散皮肤之湿热也。”《本草经疏》:“血热则须发焦枯而易堕,浮萍凉血则荣气清而须发自长矣。”

4. 《本草崇原》:“(浮萍)下水气者,太阳之气外达皮毛,则膀胱之水气自下也。”

5. 《本草求真》:“水肿不消,小便不利,用此疏肌通窍,俾风从外散,湿从下行。”

6. 《本草正义》:“浮萍,不仅专入气分,而亦必兼清血热,故《圣济》以治吐血不止,《圣惠方》又治鼻衄,溯溯以治目赤、口疮,既善清火,而又早热下行,其效良捷。近人止以发汗之药,而不知清热正其专长,殊觉未尽其用。”“浮萍,其质最轻,气味皆薄,虽曰发汗,性非温燥,必无过汗之虑。”

4128 浮小麦 lú xiǎo mài
(《本草蒙笙》)

【异名】 浮麦(《纲目》)。

【基原】 为禾本科小麦属植物小麦干燥轻浮的颖果。

【原植物】 参见“小麦”条。

【采收加工】 夏至前后,成熟果实采收后,取瘪瘦轻浮与未脱净皮的麦粒,筛去灰屑,用水漂洗,晒干。

【药材】 浮小麦 *Fructus Triticis Levis* 全国产麦区均有生产。

【异名】 樟皮(《古今录验方》)。

【基原】 为榆科植物樟树的树皮。

【原植物】 樟树 *Zelkova schneideriana* Hand.-Mazz. 又名：大叶樟(《全国中草药汇编》)，樟树、血樟(《新华本草纲要》)。

乔木，高达25m。一年生

枝密被柔毛。叶互生，硬纸质；叶柄长1~4mm；叶片椭圆形卵形、窄卵形或卵状披针形，长2~10cm，1.5~4cm，先端渐尖，基部楔形或近圆形，上面粗糙，具脱落性硬毛，下面密被柔毛；边缘具单锯齿；侧脉7~15对。花单性，稀杂性，雌雄同株；雄花簇生于新枝下部的叶腋或腋生，雌花1~3朵生于新枝上部的叶腋；花被片4~5；雄蕊与花被片同数而对生；雌花仅有雌蕊1，子房1室，花柱2，斜生。坚果上部偏斜，直径2.5~4mm。花期3~4月，果期10~11月。

多生于山坡、路旁，或栽于宅旁。分布于中、西南及江苏、福建、江西、西藏、陕西、甘肃等地。

本植物的叶(樟树叶)亦供药用，另设专条。

【栽培】 生物学特性 喜温暖湿润气候，在疏松肥沃、湿润的酸性、中性、石灰质土及轻度盐碱土中均能生长。

繁殖方法 种子繁殖，育苗移栽法。10月中、下旬待果实由青转黄褐色时采收，随采随播或用湿砂贮藏，翌年春季播种。如果用干种子播种，则播种前浸种2~3小时。条播，按行距20cm开沟，将种子均匀播入，覆土后盖草，浇水保湿。移栽按行、株距(3~4)m×(3~4)m开穴，可以利用山地造林。初期适当密植，按行、株距2~3m栽种，以后再进行疏伐。在移栽时要随即截梢。

田间管理 出苗后及时揭去盖草。苗期要勤松土、除草、灌溉和追肥。每年进行修剪，培育主干，并在主干旁缚绑一根竹竿，待主干高至5m时可拆除竹竿。幼林郁闭后要及时间伐，防止过密，影响生长。

病虫害防治 虫害有大袋蛾。

【采收加工】 全年均可采收，剥皮，鲜用或晒干。

【药性】 苦寒。

1.《别录》：“大寒。”

2.《日华子》：“味苦，无毒。”

3.《本草汇言》：“味苦，气寒。”

【功用主治】 清热，利水，解毒。主治感冒发热，水肿，痢疾，汤火灼及一切毒肿，疮疡。

1.《别录》：“主时行头痛，热结在肠胃。”

2.《本草经集注》：“夏日作饮，去热。”

3.《新修本草》：“煮汁，以疗水及断痢。”

4.《日华子》：“下水气，止热痢，安胎。主妊娠人腹痛。”“山樟树皮，治热毒风燥肿毒。”

5.《药性考》：“治温毒下血。”

6.《湖南药物志》：“主治通身水肿，毒气攻腹，小儿痢血，飞血赤痢。”

7.《全国中草药汇编》：“主治感冒头痛，肠胃实热，急性结膜炎。”

【用法用量】 内服：煎汤，3~10g。外用：煎水洗。

【禁忌】 《本草汇言》：“胃寒脾冷不食者勿用也。”



樟树

【选方】 1. 治通身水肿 樟树皮煮汁，日饮。(《圣惠方》)

2. 治小儿痢血 犀角十二分(屑)，樟皮二十分(炙，切)。上二味，以水三升，煮取一升，量大小服之。(《古今录验方》犀角樟皮煎)

3. 治毒吐下血 樟皮(广五寸，长一尺)，芦荻根五寸(如足趾大)。以水二升，煮取一升，顿服，即下血。一方以水酒共煎服亦得。(《普济方》)

4. 治毒气攻手足足痛 以樟树皮和侧皮，合煮汁如饴糖，以樟皮浓煮汁，绞饮之。(《肘后方》)

5. 治(目)飞血赤脉 樟皮(去粗皮，切)二两，古钱七文。上二味，以水一升半，煎取七合，去滓。热洗，冷则再暖。(《圣济总录》樟皮洗眼方)

【各家论述】 《本草汇言》：“此木生发易大，得春升清阳之气，其性寒平。故《别录》方治时行头痛，热结在肠胃；隐居方夏月煎饮，辟暑去热；大氏方治风热毒肿等证，悉属热病，宜此木煎饮之。”

5297 楤树皮 yǐng gǔ pí (《全国中草药汇编》)

【基原】 为豆科合欢属植物楤树或南洋楤的树皮。

【原植物】 1. 楤树 *Albizia chinensis* (Osbeck) Merr. [*Mimosa chinensis* Osbeck] 又名：牛尾木(《全国中草药汇编》)。

落叶乔木，高达30m。小枝被黄色柔毛。托叶大，膜质，心形，长可达2.5cm，先端有小尖头，早落；二回羽状复叶，羽片6~18对；总叶柄基部和叶轴上有腺体；小叶20~35对，无柄，长椭圆形，长6~8mm，宽约2mm，先端渐尖，基部近截形，具缘毛，下面被长柔毛，中脉紧靠上边缘。头状花序有花10~20朵，生于长短不同、密被柔毛的总花梗上，再排成顶生的圆锥花序；花绿白色或淡黄色，密被黄褐色绒毛；花萼漏斗状，有5短齿；花冠长约约为花萼的2倍；裂片卵状三角形，雄蕊长约25mm；子房被黄褐色柔毛。荚果扁平，长10~15cm，宽约2cm，幼时稍被柔毛，成熟时无毛。花期3~5月，果期6~12月。

多生于林中，亦见于旷野，但以谷地、河溪边等地方最适宜其生长。分布于福建、湖南、广东、广西、海南、贵州、云南、西藏等地。

2. 南洋楤 *A. falcata* (L.) Fosberg [*A. falcata* (L.) Baker] 又名：仁仁树、仁人木、麻六甲合欢(《中国树木志》)。

大乔木，高可达45m。树干通直；树皮灰青至灰褐色，不裂。嫩枝圆形或微有棱，被柔毛。偶数羽状复叶，托叶锥形；羽片11~20对，上部的通常对生，下部的有时互生；总叶柄基部和叶轴中部以上羽片着生处有腺体；小叶8~20对，菱状长圆形，长10~15mm，宽3~6mm，对生，无柄，先端急尖，基部钝或近截形，中脉偏于上缘。穗状花序腋生，单生或排成圆锥花序；花萼钟状，长约2.5mm；花初白色，后变黄，密被短柔毛，仅基部连合；雄蕊多数，花丝基部合生成管。荚果带形，长10~13cm，宽1.3~



楤树



南洋楤

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

第二版·上册

中药大辞典

◎ 南京中医药大学 编著





第一类 医药、卫生、保健
第二类 医药、卫生、保健

图书在版编目(CIP)数据

中药大辞典/南京中医药大学编著. —2版(修订本).
—上海:上海科学技术出版社,2014.6(2017.3重印)
ISBN 978-7-5478-1364-5

I. ①中… II. ①南… III. ①中药学—词典
IV. ①R28-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 292239 号

责任编辑 虞厚安 刘诗发
装帧设计 戚永昌

中药大辞典(第二版)
南京中医药大学 编著

上海世纪出版股份有限公司 出版
上海科学技术出版社
(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

上海世纪出版股份有限公司发行中心发行
200001 上海福建中路193号 www.ewen.co
苏州望电印刷有限公司印刷
开本 889×1194 1/32 印张 112.125 插页 8
字数 10917 千
1986年5月第1版
2014年6月第2版 2017年3月第34次印刷
ISBN 978-7-5478-1364-5/R·505
定价:198.00 元

本书如有缺页、错装或损坏等严重质量问题,
请向工厂联系调换



Z H O N G Y A O D A C I D I A N

首届中国辞书类一等奖
第二届中国出版政府奖图书奖

中药大辞典

南京中医药大学 编著

第二版
上册

